



Cardinal



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Muy abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad nula o muy baja

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-media
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil entre nervios Nula o muy débil sobre nervios


Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy débil de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes a ambos lados convexos de longitud media con relación longitud-anchura mediana





Cardinal



Racimo:

Tamaño Grande

Compacidad Suelto

Longitud pedúnculo Medio

Baya:

Tamaño Muy grande

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Roja-violeta oscura

Forma del perfil Esférica

Separación pedicelo Relativamente fácil

Grosor piel Media

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente jugosa

Suculencia pulpa Ligeramente jugosa

Sabores particulares Gusto especial

Formación pepitas Bien formadas

Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio, muy fértil, de ciclo corto.
- Se aconseja una poda corta, portainjerto poco vigoroso, y abonado escaso.
- El hollejo puede rajarse si llueve durante la vendimia.
- Resiste a la sequía, bien adaptado a los terrenos poco fértiles. Admite podas cortas. Exigente en potasio. En zonas frescas no madura correctamente. Muy buena uva de mesa.
- Sabor agradable.
- Aguanta bien el transporte.
- Muy sensible al oídio.