



Palomino



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil-media Densidad media-alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Media en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-media
---	-------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Alta entre nervios
--------------------------------	--------------------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
-------------------------	--------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en V
--	-------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media-fuerte
--------------------------	--------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Rojo hasta la primera bifurcación
-----------------------------	-----------------------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media-alta
--	------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-baja
---	-----------


<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Corto densidad media
--	-------------------------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medianos y con relación longitud-anchura mediana-grande
------------------------------------	--





Palomino



Racimo:

Tamaño	Mediano-grande
Compacidad	Medio-compacto
Longitud pedúnculo	muy corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	No uniforme
Color Epidermis	Verde-amarilla
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Delgada
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón amarillento
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media

Época de comienzo de envero: media

Aptitudes agronómicas:

- Planta medianamente vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad elevada. Producción media, racimos entre medianos y grandes.
- Cepa de resistencia media a sequía, adaptada a terrenos muy calizos. El sistema más adecuado de poda es el de vara y pulgar.
- Es sensible a la polilla del racimo y termitas y resistente a enfermedades.

Potencial enológico:

- Vino de graduación media, color amarillo muy pálido, muy neutro en nariz, ligeros aromas herbáceos, acidez baja, vino ligero.
- La vocación de la Palomino es la elaboración de vinos generosos sometidos a un proceso de crianza biológica para obtener manzanillas, finos, olorosos y amontillados.

