



Sultanina

Sinonimias: Thompson Seedless



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad

Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad

Pigmentación muy débil
Densidad nula o muy débil-débil

Pámpano:

Color entrenudo

Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color entrenudo

Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados

Nula o muy débil entre nervios
Débil sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Grande

Forma del limbo

Pentagonal

Número de lóbulos

Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar

Poco abierto-ligeramente superpuestos

Hinchazón del haz

Débil

Perfil en sección transversal

Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores

Profundidad muy superficial-superficial con lóbulos abiertos

Pigmentación del haz

Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales

Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales



Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo

Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura media-grande





Sultanina



Racimo:

Tamaño Grande

Compacidad Suelto

Longitud pedúnculo Medio

Baya:

Tamaño Pequeña o grande (en función de tratamientos)

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde-amarilla

Forma de perfil Circular

Separación pedicelo Relativamente fácil

Grosor piel Fina-media

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Blanda

Suculencia pulpa Ligeramente jugosa-
Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Rudimentarias

Sarmiento:

Color Amarillo

Relieve superficie Lisa-estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

Aptitudes agronómicas:

- Muy vigorosa y medianamente productiva. Se adapta bien a la conducción en parral. Fertilidad débil, exige poda larga. Sensible al corrimiento y al millerandage.
- Cuando no se cultiva adecuadamente los racimos se desgranar fácilmente.
- Al ser apirena se aconsejan diversos tratamientos, como giberélico, aclareo de racimos, anillado y aclareo de bayas.
- Cierta sensibilidad al oídio. Sensible a la antracnosis y al mildiu.

Potencial enológico:

- Vino neutro de acidez pronunciada, fresco. A veces como vino base para vinos espumosos.
- Uva óptima para el consumo en fresco (muy azucarada, acidez delicada, piel delgada, sabor neutro) y excepcional para el consumo como uva pasificada, puesto que las bayas se secan fácilmente dando pasas de gran calidad.