



Syrah



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta-muy alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en nudos Baja en entrenudos
--------------------------------	-------------------------------------

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Densa entre nudos Densa sobre nervios
--------------------------------	--

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
--	---------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés-alabeado
--------------------------------------	--------------------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
-----------------------------	---------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media entre nervios
--	---------------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja sobre nervios
---	--------------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados
--	---

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña-mediana
------------------------------------	--





Syrah



Racimo:

Tamaño	Medio
Compacidad	Medio
Longitud pedúnculo	Medio

Baya:

Tamaño	Pequeña-media
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul negra
Forma de perfil	Circular-elíptica corta
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Media-gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Ligeramente dura
Suculencia pulpa	Apenas jugosa-ligeramente jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formada

Sarmiento:

Color	Marrón amarillento-marrón oscuro
Relieve superficie	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: temprana

Aptitudes agronómicas:

- Emite pámpanos largos y frágiles, sensible al viento, por lo que debe ser empalizada y podada corta
- Muy sensible a clorosis y mal adaptada a suelos calizos.
- Período óptimo de recolección relativamente corto. Evitar un exceso de rendimiento y sobremaduración.
- Bastante sensible a ácaros y a botrytis, sobre todo al final de la maduración. Resistente al mildiu, al oídio y a la excoriosis.

Potencial enológico:

- Vinos tintos de buen grado alcohólico aptos para un envejecimiento de gran calidad, de color intenso (azulado), muy aromáticos, finos y complejos con aromas que recuerdan la violeta, el cuero, el tabaco y el regaliz; tánicos, con estructura y relativamente poco ácidos.
- Es posible elaborar también vinos rosados muy afrutados e interesantes.

