



Verdejo



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-fuerte Densidad débil-media

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Nula o muy baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Media-fuerte
---	--------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Débil
--------------------------------	-------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Pequeño-medio
-------------------------	---------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto en lira
--	-------------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Medio
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Rojo hasta la primera bifurcación
-----------------------------	-----------------------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
--	-----------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
---	-----------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Densidad nula o muy baja de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud larga y con relación longitud-anchura grande
------------------------------------	---





Verdejo



Racimo:

Tamaño Pequeño-mediano

Compacidad Compacto

Longitud pedúnculo Muy corto

Baya:

Tamaño Mediana

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde-amarilla

Forma de perfil Acuminada

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Fina

Pigmentación pulpa No coloreada

Consistencia pulpa Blanda

Suculencia pulpa Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Presentes

Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Estriado

Fenología:

Época de desborre: temprana-media

Época de maduración: temprana-media

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad baja. Producción media, racimos pequeños.
- Medianamente resistente a sequía, adaptada a terrenos poco fértiles, arcillosos. Precisa podas largas para obtener producciones aceptables.
- Muy sensible a oídio.

Potencial enológico:

- Vinos medianamente alcohólicos, de color amarillo verdoso con tonos acerados, muy aromáticos, en nariz destacan los aromas a almendra amarga, acidez entre media y alta, son vinos con cuerpo pero con cierta suavidad, el retrogusto es ligeramente amargo.
- Su vocación es ser empleado para la elaboración de vinos generosos al estilo de Jerez empleando la Palomino para mezclar. Actualmente se elaboran magníficos vinos jóvenes monovarietales o mezclados con Sauvignon o Macabeo en diferentes proporciones, últimamente se están elaborando vinos de Verdejo con fermentación o crianza en barricas de roble.

