



Black Rose



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación muy débil
Densidad débil

Pámpano:

Color entrenudo Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en el nudo
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Muy débil entre nervios
Muy débil sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Muy grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abierto-cerrado

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Bordes hacia el envés

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos cerrados


Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja-baja


Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura media





Black Rose



Fenología:

Época de desborre: temprana-media

Época de maduración: media

Racimo:

Tamaño Muy grande

Compacidad Muy suelto

Longitud pedúnculo Muy corto

Baya:

Tamaño Muy grande

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Negra-azul

Forma de perfil En forma de cuerno

Separación pedicelo Difícil-relativamente fácil

Grosor piel Media

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Ligeramente dura-
muy dura

Suculencia pulpa Jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formadas

Sarmiento:

Color Marrón amarillento

Relieve superficie Estriada