



Bobal



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media densidad entre media-alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---


<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Media-alta en el entrenudo
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte-muy fuerte

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Orbicular
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Superpuestos en V
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Alta
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-débil
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña





Bobal



Racimo:

Tamaño	Mediano-grande
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul negra
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Media
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: medio-tardío

Época de maduración: medio-tardío

Aptitudes agronómicas:

- Planta vigorosa, porte semierguido.
- Fertilidad alta, producción media alta, racimos grandes.
- Muy resistente a sequía, se adapta mejor a suelos sueltos y aireados. Se adapta bien a podas cortas.
- Sensible a oídio y botrytis.

Potencial enológico:

- Vinos alcohólicos, color intenso, cereza oscuro con tonos violáceos, aroma ligero con tonos herbáceos, acidez media, vino áspero con gran contenido de taninos.
- Se empleaba como vino de pasto para mezclar con Airén, en la actualidad se están obteniendo buenos resultados en la elaboración de rosados frescos y afrutados.

