



Flame Seedless



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil
Densidad débil

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Media

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio-abierto en U

Hinchazón del haz Nulo o muy débil-débil

Perfil en sección transversal Forma de V

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos entre ligeramente superpuestos y muy superpuestos

Pigmentación del haz Fuerte

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana-grande





Flame Seedless



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Media
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Roja-roja gris
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Fina
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Sabor especial
<i>Formación pepitas</i>	Rudimentarias

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estríada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

Aptitudes agronómicas:

- Variedad de vigor medio, si se quiere aumentar el rendimiento se utiliza una poda larga. La poda corta también es posible.
- Bayas de sabor neutro.
- Buena respuesta a tratamientos con giberrelinas o por incisión anular a fin de aumentar el tamaño de las bayas.

Potencial enológico:

- Exclusivamente como uva de mesa.
- Cualidades gustativas y organolépticas buenas.