



# Macabeo

Sinonimias: Viura.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta-muy alta

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media en nudos Media en entrenudos
--------------------------------	---------------------------------------

### Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Muy densa entre nervios Densa sobre nervios
--------------------------------	--

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en lira
--	-------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés
--------------------------------------	-----------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos muy superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
-----------------------------	---------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
--	-------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
---	-----------------


<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad media de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana
------------------------------------	---





# Macabeo



## Racimo:

Tamaño	Grande
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Corto

## Baya:

Tamaño	Media
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde amarilla
Forma de perfil	Circular
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Muy jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formadas

## Sarmiento:

Color	Marrón amarillento- Marrón oscuro
Relieve superficie	Estríada

## Fenología:

Época de desborre: tardía

Época de maduración: tardía

## Aptitudes agronómicas:

- Variedad productiva, de porte erquido, cuyos sarmientos se desprenden fácilmente bajo la acción del viento. Fertilidad entre buena y media.
- Evitar implantarla en terrenos frescos y húmedos, así como en terrenos muy secos donde se muestra sometido al folletaje o a una caída precoz de hojas.
- Bastante sensible a ácaros, oídio. Muy sensible a podredumbre gris y necrosis bacteriana. Poco sensible al mildiu.

## Potencial enológico:

- Vinos de diferentes tipos. Fermentada controlando la temperatura de vinos blancos, ligeros con aromas casi florales relativamente intensos. Sabor ligeramente astringente, con un correcto equilibrio entre acidez y alcohol.
- Utilizada en el cupaje de Airen, con tintos jóvenes o de crianza para aportar acidez al conjunto.
- Aptos para fermentación en barrica. Utilizada en la elaboración de cavas.

