



Merlot



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil-media
Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo Verde en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados Media entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Grande

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Medio abierto en U

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos



Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula-baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana





Merlot



Racimo:

Tamaño	Medio
Compacidad	Media
Longitud pedúnculo	Corto

Baya:

Tamaño	Pequeña
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul-negra
Forma de perfil	Elíptica-ancha
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Gruesa
Pigmentación pulpa	Ausente o muy débil
Consistencia pulpa	Blanda-ligeramente dura
Suculencia pulpa	Ligeramente jugosa-muy jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Bien formada

Sarmiento:

Color	Marrón oscuro
Relieve superficie	Lisa

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: temprana-mediana

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio-alto con fuerte tendencia a emitir chupones. Porte semierguido que obliga a colocar un empalazamiento que la soporte.
- Fertilidad buena. Preferible poda corta. Prefiere suelos argilicos calcáreos. Sensible al corrimiento según la climatología.
- Sensible a heladas primaverales. Poco adaptada a la sequía.
- Sensible al mildiu, cicadélidos, poco sensible a botrytis. No sensible a oidio, flavescencia dorada, ni a las enfermedades de la madera.

Potencial enológico:

- Vinos redondos con cuerpo, ricos en alcohol y color. Relativamente poco ácidos.
- Vinos con taninos, pero bastante suaves que no necesitan de un alargado envejecimiento en bodega. Aromas complejos y elegantes.

