



Moscatel de Grano Menudo

Sinonimias: Moscatel Morisco.



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad débil

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil en el nudo Nula o muy débil en el entrenudo
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Fuerte
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Débil-media

Hoja adulta:


<i>Tamaño del limbo</i>	Media
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en V
<i>Hinchazón del haz</i>	Entre débil y media
<i>Perfil en sección transversal</i>	En V
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo corto con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados rectilíneos, de longitud media y con relación longitud-anchura mediana



Fuente: Variedades de vid. Registro de variedades comerciales. Coordinador: Chomé, P.M.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



Moscatel de Grano Menudo



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-mediano
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Delgada
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Moscatel
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón-amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

Fenología:

Época de desborre: entre temprana y media

Época de maduración: muy temprana

Aptitudes agronómicas:

- Planta poco vigorosa, porte entre semierguido y erguido.
- Fertilidad media. Poco productiva, racimos pequeños.
- Medianamente resistente a sequía, prefiere suelos pobres y que retrasen la maduración. Precisa podas largas.

Potencial enológico:

- Vino muy alcohólico de color amarillo dorado, muy aromático, aromas florales propios de la variedad que recuerdan a miel, cierto retrogusto amargo, acidez alta, vino muy amplio y sabroso en boca.
- Antiguamente se empleaba para la elaboración de vinos dulces denominados "supurados". Actualmente se emplea para elaborar vinos jóvenes o fermentados en barrica con cierto grado de azúcar.

