



# Pardina

Sinonimias: Baladí. Baladí verdejo. Calagraño. Jaén blanco. Robal.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-fuerte Densidad débil

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Media en el entrenudo

### Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Media
---	-------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula-débil
--------------------------------	------------

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
-------------------------	-------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Ligeramente superpuestos en V
--	-------------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
--------------------------	-------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Alta
--	------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-baja
---	-----------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad media de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud largos y con relación longitud-anchura grande
------------------------------------	---





# Pardina



## Racimo:

Tamaño	Grande
Compacidad	Compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

## Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde-amarilla
Forma de perfil	Estérica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

## Sarmiento:

Color	Marrón amarillento
Relieve superficie	Liso-estriado

## Fenología:

Época de desborre: tardío

Época de comienzo de envero: muy tardío

## Aptitudes agronómicas:

- Planta muy vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad muy elevada, muy productiva, racimos muy grandes.
- Resistente a sequía, se adapta mejor en suelos poco fértiles y aronosos. Se adapta correctamente a podas cortas.
- Muy sensible a oidio y botrytis, es atacada por erinosis y acariosis.

## Potencial enológico:

- Vinos poco alcohólicos de color pálido, en general muy poco aromáticos, acidez media-alta.
- Su vocación es la elaboración de vinos destinados a la obtención de holandas para la elaboración de vinos generosos o brandis. En la actualidad se elaboran vinos jóvenes de calidad con fermentación controlada y adición de levaduras seleccionadas y mezclando con Macabeo.

