



Pedro Ximénez



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierto
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficiales-medios con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura grande





Pedro Ximénez



Racimo:

Tamaño Grande

Compacidad Medio

Longitud pedúnculo Corto

Baya:

Tamaño Media

Uniformidad tamaño Uniforme

Color Epidermis Verde-amarilla

Forma de perfil Circular

Separación pedicelo Difícil

Grosor piel Gruesa

Pigmentación pulpa Ausente o muy débil

Consistencia pulpa Blanda

Suculencia pulpa Muy jugosa

Sabores particulares Ninguno

Formación pepitas Bien formadas

Sarmiento:

Color Marrón oscuro

Relieve superficie Asurcada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Porte erguido, variedad vigorosa de buena producción.
- Racimos poco uniformes con gran cantidad de uvas menudas.
- Muy sensible al botrytis y a mildiu. Sensible a oidio.
- Sensible a la yesca, eutipiosis y termitas.

Potencial enológico:

- Mostos muy alcohólicos, con baja acidez. adecuados para crianza biológica.
- Pasificadas se obtienen mostos de 30-32° Baumé dando los vinos Pedro Ximénez. Son vinos muy azucarados, con bastante extracto seco, y que conserven su gusto de fruta y aroma particular.

