



Selección Oppenheim del Teleki n.º 4

S04

Aptitudes culturales:

- Este patrón se ha ido imponiendo en los últimos tiempos en muchas zonas vitícolas porque confiere a los injertos un desarrollo, una entrada en producción muy rápida y un gran vigor, que es capaz de mantener durante la vida de la plantación, teniendo en cuenta que además favorece la fructificación y adelanta la maduración.
- Es bastante resistente a contenidos elevados de caliza en el suelo, aunque a veces se indica que no es superior al 110 R, adaptándose muy bien en terrenos con subsuelo fresco y húmedo, pero el comportamiento en suelos secos es bastante malo.
- Es sensible a la carencia de magnesio y tiende a agravar los problemas de desecación del raspón.
- Es resistente a los nematodos (*Meloidogyne* sp.).
- Sus campos de pies madres producen mucha madera que enraíza bien. Responde adecuadamente al injerto en campo aunque el de taller no va excesivamente mal.
- En Francia y zonas frescas ha sido considerado como el portainjerto más importante, pero su excesivo vigor, la producción de vinos de calidad mediocre y los problemas de desecación del raspón le convierten en un portainjerto pasado de moda.




Ampelografía:

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Ligeramente abierto
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil-media

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Rojo en la cara dorsal Rojo en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos



Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales

Nula o muy débil

Densidad pelos tumbados

Nula o muy baja entre nervios
Nula o muy baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo

Grande

Forma del limbo

Deltaide

Número de lóbulos

Tres

Disposición lóbulos del seno peciolar

Medio abierto

Hinchazón del haz

Media

Perfil en sección transversal

Forma de V

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores

Profundidad estre muy superficial-superficial con lóbulos abiertos

Pigmentación del haz

Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales

Nula o muy baja entre nervios del envés

Densidad pelos erguidos sobre nervios principales

Media sobre nervios del envés

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo

Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes

Dientes a ambos lados rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana

Hoja adulta:

Color

Marrón rojizo

Relieve superficie

Estriado